

Reprendre la campagne de vaccination



- Patients transplantés
- Entourage des patients (cocooning)
- Soignants



6 mois après le dernier rappel ou la dernière infection Covid-19 (envisageable dès 3 mois)



Vaccin Pfizer monovalent Cominarty JN1 (30ug IM)
A faire de préférence en même temps que le vaccin anti grippal (une dose dans chaque bras)



Pas d'anticorps monoclonal disponible sur le marché efficace contre les variants circulants qui portent à ce jour très majoritairement la mutation de résistance F456L




- Maintien des gestes barrière
- Port du masque dans les lieux clos, les hôpitaux et les transports en commun



Encourager les patients à faire rapidement une PCR ou un test antigénique en cas de symptômes



Encourager les patients à prévenir rapidement leur centre de suivi en cas de positivité du test



En cas d'infection Covid-19

En raison de l'absence de données confirmant l'efficacité du Paxlovid à l'ère Omicron chez les patients transplantés et des risques d'interactions médicamenteuses parfois sévères, l'utilisation de Paxlovid ne peut plus être recommandée de façon générale.

Que faire en cas de frottis positif le jour de l'appel de greffe ?

- Si patient asymptomatique ou pauci-symptomatique en fin d'infection, sous réserve d'une imagerie pulmonaire rassurante
- **Transplantation autorisée (rein et foie)**