

## FICHE SYNTHÈSE VACCINATION ET MALADIE RENALE CHRONIQUE (Juin 2024)

Cette fiche est à destination des adultes pris en charge en Néphrologie. Elle n'inclut pas les femmes enceintes et les enfants âgés de moins de 15 ans.

TYPE VACCIN	Vaccinations recommandées dans la MRC hors patients sous immunosuppresseurs		Vaccinations recommandées patients sous immunosuppresseurs*
Diphthérie Tétanos Poliomyélite Coqueluche	1 dose à : 25 ans 45 ans 65 ans 75 ans 85 ans 95 ans	Reprendre le rythme vaccinal préconisé ci-contre, espace minimum entre 2 doses : 5 ans	1 dose tous les 10 ans
Hépatite B	2 doses de 20 µg à M0, M1, M2, M6		
Pneumocoque	Faire 1 dose unique vaccin pneumococcique 20 valents		
Grippe vaccin injectable	1 dose tous les ans		
Covid 19	Selon recommandations HAS en vigueur en fonction de l'évolution de la pandémie <a href="https://professionnels.vaccination-info-service.fr/Maladies-et-leurs-vaccins/COVID-19">https://professionnels.vaccination-info-service.fr/Maladies-et-leurs-vaccins/COVID-19</a>		
VRS	1 dose pour les + de 60 ans, <i>non remboursée actuellement</i>		
Varicelle	2 doses (M0-M1) recommandées en pré greffe	INTERDIT	
Zona	A partir de 65 ans ou 18 ans si immunodéprimé 2 doses SHINGRIX® (M0-M2)		
Papillomavirus	Si vacciné après 14 ans ou immunodéprimé : 3 doses (à M0-M2-M6) jusqu'à 19 ans ou 26 ans chez patient à risque*		
Méningocoque B	Avant traitement par Eculizumab, et situation de splénectomie, asplénie, allogreffe 2 doses (M0-M1) puis rappel tous les 5 ans pendant la durée du traitement		
Méningocoque ACYW	Avant traitement par Eculizumab, et situation de splénectomie, asplénie, allogreffe 2 doses (M0-M6) puis rappel tous les 5 ans pendant la durée du traitement		
Fièvre jaune	1 dose à recommander à tous en pré-transplantation *	INTERDIT	
Rougeole Oreillon Rubéole	Pour les personnes susceptibles de voyager en zones endémiques, les migrants venant de zones endémiques ou pour les professionnels de santé. 2 doses (M0-M1) pour les personnes nées après 1980 1 dose si né(é) avant 1980 *	INTERDIT	
Hépatite A	Uniquement patients à risque* ayant une sérologie négative		
Rage	Uniquement pour les patients exposés*		
Leptospirose	Uniquement pour les patients exposés*		
* se rapporter au tableau complet			