


# Prévention anti Covid-19 des patients transplantés d'organe

Version V1.1 du 4 octobre 2022



## Patients répondeurs au vaccin



Après un schéma vaccinal complet



Poursuivre la vaccination par des rappels tous les 3 à 6 mois en phase épidémique de **préférence par vaccin bivalent BA4-5**

### Quels vaccins ?

- Moderna: Spikevax® monovalent, **Spikevax® bivalent Original/ Omicron BA.1**
- **Pfizer**: Comirnaty® monovalent, **Comirnaty bivalent Original/ Omicron BA.1, Comirnaty bivalent Original/ Omicron BA.4-5 (à partir du 6 oct)**



### Où se faire vacciner ?

- Pharmacie
- Médecin traitant
- Centres de vaccination



## Patients non répondeurs\* au vaccin

Poursuivre les injections d'anticorps monoclonaux → Evusheld **600 mg IM** tous les 6 mois


### Comment ?

- Faire la demande d'accès précoce après inscription sur le site (seulement pour la 1ère injection)



[www.prophylaxie-tixagevimab-cilgavimab.fr](http://www.prophylaxie-tixagevimab-cilgavimab.fr)

- Avoir une PCR Covid-19 négative < 72 h ou un test antigénique < 24h



### Où ?

- Hôpital de jour
- HAD



## Après infection Covid-19

Rappel de vaccin Covid dès 3 mois après l'infection

## Pour tous

- **Maintien des gestes barrière**
- **Vaccination de l'entourage**
- **Port du masque, FFP2 dans les lieux clos et les transports en commun**
- **Vaccination anti grippale** (peut être couplée au vaccin anti Covid): à partir du 18 octobre
- Rappels de vaccin et Ac monoclonaux peuvent être combinés chez les patients faibles répondeurs (à 15 j d'intervalle)

\* Patients non répondeurs et faibles répondeurs: < 260 BAUs/ml



Société  
Francophone de  
Transplantation