



*Société  
Francophone de  
Transplantation*



## Mise à jour des recommandations concernant la prophylaxie anti-Covid chez les patients transplantés

En accord avec les recommandations de la HAS et du COSV

### Au 22 septembre 2022

1. Pour les patients répondeurs à la vaccination : poursuivre le schéma vaccinal avec un rappel au moins tous les 6 mois en période épidémique, le rappel peut être fait dès 3 mois après la précédente injection pour les patients particulièrement exposés ou à risque de forme sévère. Les vaccins bivalents (souche Wuhan/BA1 ou souche Wuhan/BA5) sont à privilégier lorsqu'il seront disponibles mais le rappel avec un vaccin à ARNm monovalent ne doit pas être différé en attendant leur disponibilité
2. Pour les patients non répondeurs à la primo vaccination (3 doses) et qui ont reçu des Ac monoclonaux en préventif : poursuivre Evusheld à la dose de 600 mg tous les 6 mois.
3. Pour les patients qui ont développé le Covid-19 : prévoir l'injection de rappel ou l'Evusheld à partir de 3 mois après la date de l'infection et tous les 6 mois
4. Nous recommandons le maintien du port du masque, de préférence FFP2 dans les transports en communs et les lieux clos
5. Nous recommandons la vaccination de l'entourage proche des patients transplantés
6. Nous recommandons la vaccination anti grippale qui peut être couplée au vaccin anti Covid-19